

FIEBER)、えびも (*P. crispus* L.)、(*P. distinctus* BENN.)、おぼのひるむしろ (*P. Fryerii* BENN.)、まれーひるむしろ (*P. malaianus* Miqu.)、ささえびも (*P. nipponicus* MAKINO)、ほそはみづひきも (*P. numasakianus* BENN.)、やなぎも (*P. oxyphyllus* MIG.)、りゅうのひげも (*P. pectinatus* L.)、ひろはのえびも (*P. perfoliatus* L. var. *japonicus* NAKAI)ノ諸種デ、此等ノ標本ノ大部分ハ京都帝大ノ小泉博士ト大井學士トニ御検定頂イタ物デスガ、今後精査スレバマダマダ種類ガ加ハルコト思ヒマス。 (林 實)

〇たちみぞかくしノ分布北上

臺灣北部ニ本種(*Lobelia trigona* ROXBURG)ヲ産スルコトハ山本由松博士ノ報文ニ明カデアル。莖ガ直立シみぞかくしトハ大分趣ガ違フモノデ^{カデナ}印度以東南支ニ分布シテ居ル。先日東大醫學部藥學教室所藏ノ標本ヲ一見タ内ニ沖縄本島、嘉手納^{カデナ}デ緒方正資氏ガ採集サレタ本種ヲ見出シタ。臺灣カラ琉球マデ一投足デハアルガ、分布ノ東限カト思ハレル。

Lobelia trigona ROXBURG; YAMAMOTO, in Journ. Soc. Trop. Agr. Taihoku 8 : 148 (1936).

Hab. Ryūkyū, insula Okinawa, Katena (M. OGATA, Maio 1923) Additamentum novum ad Floram Liukiunensem. (前川文夫 F. MAEKAWA)

〇臺灣ノいらくさ屬

從來臺灣ノいらくさ屬ハいらくさ其物一種ヲ産スルコトニナツテ居ツテ、一昨年出タ最新臺灣植物總目錄デモコノ意見ヲ記シテ居ル。シカシ我が教室所藏ノ標本ノ示ス處デハ臺灣ニアルいらくさハ内地ノモノデハナクテ全然別個ノ種類デアル。いらくさ (*Urtica Thunbergiana* SIEBOLD et ZUCCARINI) ハ葉ノ縁邊ニハ極メテ規則正シイ中形ノ鋸齒ガ並ビ、各鋸齒一個ハ鎌狀ヲナシテ前方ニ曲リ心地ヲナシ、且ツコノ縁邊ノ中央邊ニハ多クハ各側ニ一個或ハ二個ノ小鋸齒ヲ具ヘテ、全體トシテハ簡單デ端正ナ重鋸齒縁ヲ呈スル。鋸齒ノ數ハ各側 10 個内外デアル。然ルニ臺灣産ハ縁邊ニハ先ヅ各側 4-6 個ノ疎大ノ三角狀ヲ呈スル齒牙ガアツテ寧ロ淺裂トイフニ近ク、コノ齒牙ノ直線的ナル兩邊ニハ多數ノ小齒牙ヲ稍不規則ニ有シ、全體トシテハ疎大重齒牙縁デアル點デ皆一致シ又内地産カラ區別シウル。コレハ *Urtica fissa* PRITZEL ニアタルモノデアル。臺灣産ヲ *U. fissa* トスル意見ハ HANDEL-MAZZETTI 氏ガ 1929 年ニ彼ノ Symbolæ Sinicæ 中デ FAURIE 師ノ臺灣採品 No. 1411ヲ本種トシテ居ルノト、GAGNEPAIN 氏ガ同年ニ LECOMTE 氏ノ Flore generale de L'Indo-chineニ *U. fissa* ノ分布ニ臺灣ヲ加ヘタノトニ始ル様デアル。H. MAZZETTI 氏ニヨレバ支那本部デ從來記録サレタ *Urtica Thunbergiana* ハ皆誤リデアツテ、*Urtica fissa* カ或ハ同氏ノ新種 *Urtica silvatica* H.-MAZZETTI ト *U. macrorrhiza* H.-MAZZETTI デアルトイフ。*Urtica fissa* ハ四川カラ湖北、福建、更ニ臺灣ニ飛ビ、又西南方ハ Tonkin ニ迄分布シテ居ル。上記ノ GAGNEPAIN 氏ノ論文中ニ挿圖ガアツテソノ特徴ノアル葉型ガ一目瞭然デアル。モツトモ同圖ニ葉ヲ互生トシテアルノハ、ウツカリシタ誤描ト見テヨイ。いらくさモ